Présence de racines, d'une tige, de feuilles

- Feuille de section circulaire, 1 à 2 mm de diamètre, jusqu'à 10 cm de long et se terminant par une pointe → *Syringodium isoetifolium*

- Feuille aplatie longue en lanière ou courte et ovale
  - Feuille ovale avec un pétiole distinct
    - Bord lisse, pas de poils sur le limbe
      - Limbe ovale à elliptique, > 5mm de large et 1 à 4 cm de long ; 10-25 paires de nervures latérales insérées à 45-60° sur la nervure principale → *Halophila ovalis*
      - Limbe ovale à rond, < 5mm de large et 0,5-1,5 cm de long ; moins de 10 paires de nervures latérales insérées à 70-90° sur la nervure principale → *Halophila minor*
    - Bord denticulé, présence de poils sur le limbe et sur les écailles du rhizome
      - Limbe de 5mm de large et 1,5-2,5 cm de long ; poils translucides sur les 2 faces du limbe ; pétiole de section triangulaire → *Halophila decipiens*
      - Limbe de 4-9 mm de large et 1,5-3 cm de long ; poils translucides sur la face supérieure du limbe ; pétiole de section concavo-convexe → *Halophila capricorni*
  - Feuille en lanière, 30-150 cm de long et 1-2 cm de large, bord des feuilles épais et enroulé, rhizome épais et velu ; nombreuses fibres à la base des feuilles → *Enhalus acoroides*
  - Feuille en lanière ou en ruban, sans pétiole
    - Feuille linéaire à curviligne ; bord mince ; rhizome lisse
      - Feuille plate sans ligule, rhizome de 5 mm de diamètre, 1 écaille à chaque noeud → *Thalassia hemprichii*
      - Feuille plate avec ligule et gaine bien développée
        - Feuille allongée et droite ; 1,2-2 mm de large
          - Feuille à 3 nervures ; 1,5-2 mm de large ; sommet de la feuille avec 3 dents ; → *Halodule uninervis*
          - Feuille 0,25-1,25 mm de large ; sommet arrondi légèrement denté ; nervure centrale noire au sommet, formant un V → *Halodule pinifolia*
        - Feuille allongée à curviligne ; > à 2 mm de large
          - Sommet rond à aplati, fortement denticulé; gaine triangulaire translucide à violacée ; tiges dressées portant de nombreuses cicatrices foliaires n'entourant pas complètement la tige → *Cymodocea serrulata*
          - Sommet souvent en forme de cœur ; présence de quelques dents très fines ; gaines pourpres résistantes ; tiges dressées portant des cicatrices foliaires entourant complètement la tige → *Cymodocea rotundata*

Source : Phanérogames marines de Nouvelle-Calédonie, IRD, 2005.
Dessins et représentation : Carole BERNARD, avec l'aide de Julien Barrault, CIE.NC.